

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

ATOPICKÁ DERMATITIDA V ROCE 2009

1. **Společně rysy pro všechny formy atopické dermatitidy jsou:**
 - a) pruritus, chronická dermatitida, pozitivita specifických IgE
 - b) pruritus, chronická dermatitida, xeróza
 - c) pruritus, chronická dermatitida, pozitivní rodinná anamnéza atopie
 - d) pruritus, chronická dermatitida, alergie
2. **Proaktivní léčba atopické dermatitidy znamená:**
 - a) intervalová léčba
 - b) léčba pouze při zhoršení atopické dermatitidy
 - c) včasná léčba lokálními kortikoidy či imunomodulátory při prvních příznacích exacerbace
 - d) druh léčby předcházející před aktivní léčbou
3. **Pozitivita specifických IgE:**
 - a) je spojena s intrinzickou fází (formou) atopické dermatitidy
 - b) predikuje vždy těžký průběh
 - c) výše hodnot koreluje se závažností atopické dermatitidy
 - d) nemusí být přítomna
4. **Atopická dermatitida se dědí více:**
 - a) po matce
 - b) po otci
 - c) není rozdíl v dědičnosti ohledně pohlaví rodičů
 - d) při mladším věku rodičů
5. **Zlatý stafylokok na kůži u atopické dermatitidy:**
 - a) je neškodným symbiontem
 - b) vede k většímu pruritu a chronicitě atopické dermatitidy
 - c) nemá vliv na snížení účinnosti lokálních kortikoidů
 - d) je přítomen u většiny pacientů
6. **Alokineze u atopické dermatitidy znamená:**
 - a) nekoordinované škrábavé pohyby dané poruchou pohybového centra
 - b) pruritus u atopické dermatitidy vyvolaný pohybem
 - c) reagování atopika na různé podněty svěděním
 - d) souhyby končetin při svědění
7. **Lokální kortikosteroidy u atopické dermatitidy:**
 - a) začíná se vždy slabším a při malém efektu se přechází na silnější
 - b) se smí používat pouze slabé či středně silné
 - c) výběr síly se individuálně řídí podle závažnosti, věku a lokalizace
 - d) raději slabší po delší dobu než silnější po krátkou dobu
8. **Lokální imunomodulátory u atopické dermatitidy:**
 - a) jsou vhodné zejména k udržovací léčbě
 - b) se smí používat pouze intermitentně
 - c) nesmí se kombinovat s očkováním, i když se aplikují mimo místo vakcinace a na malou plochu
 - d) při aktivaci je třeba aplikace 2krát/den
9. **Lokální antibiotika u atopické dermatitidy se používají:**
 - a) kontinuálně či intermitentně k redukcii stafylokoků na kůži
 - b) cíleně na základě zjištění citlivosti ze stěru na bakteriologické vyšetření
 - c) pouze při klinicky zjevné impetiginizaci
 - d) jen v kombinaci s antibiotiky celkovými
10. **Vhodná celková imunosupresiva pro dlouhodobou léčbu velmi těžké atopické dermatitidy jsou:**
 - a) cyklosporin A intermitentně
 - b) kortikosteroidy kontinuálně v nízkých dávkách
 - c) methotrexát v pulzním dávkování 1krát týdně
 - d) cyklofosfamid kontinuálně v nízkých dávkách

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, necht' zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 1/2009:

MUDr. J. Říčař: Kožní onemocnění sportovců

Správné odpovědi: 1b, 2bc, 3c, 4ad, 5bd, 6ad, 7bc, 8b, 9ad, 10bd