

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Pruritus esenciální vyvolávají:**
 - a) histaminoliberatory potravin
 - b) notalgia paresthetica
 - c) příčina není známa
 - d) aditiva potravin
2. **Základní laboratorní vyšetření u pacientů s pruritem zahrnuje:**
 - a) jaterní testy
 - b) intradermální testy pro reakce zprostředkované IgE
 - c) funkční testy štítné žlázy
 - d) nefrologické vyšetření
3. **U chronického pruritu se vyskytují na kůži:**
 - a) hypopigmentace
 - b) hyperpigmentace
 - c) jizvy
 - d) prurigo nodularis
4. **Vazebná místa pro neuromediátory nemají:**
 - a) Merkelovy buňky
 - b) endotelie drobných cév
 - c) leukocyty
 - d) Langhansovy mnohояaderné buňky
5. **Pruritus anogenitalis může vyvolat:**
 - a) chlamydiová proktitida
 - b) syfilis
 - c) hormonální změny
 - d) fixní lékový exantém
6. **Neurogenní pruritus není typický u:**
 - a) scabies
 - b) mozkové mrtvice
 - c) polycythemia vera
 - d) sclerosis multiplex
7. **Nemocný s pruritem obvykle pociťuje úlevu:**
 - a) ochlazením kůže
 - b) v teple
 - c) ve spánku
 - d) bolestivým škrábáním
8. **Doporučené rozšířené vyšetření u systémového pruritu zahrnuje:**
 - a) vyšetření hladin komplementu
 - b) antithyreoidální protilátky
 - c) elektroforézu bílkovin v séru
 - d) kryoproteiny
9. **Lokální léčba pruritu zahrnuje:**
 - a) capsaicin
 - b) inhibitory calcineurinu
 - c) opioidy
 - d) homeopatika
10. **Diferenciální diagnostika generalizovaného pruritu zahrnuje:**
 - a) taktilní halucinózu
 - b) syfilis
 - c) infekci AIDS
 - d) urémii

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaného v č. 3/2012:

Říčař J.: Nejčastější primární jizvící alopecie

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3ab, 4a, 5c, 6b, 7ac, 8bc, 9bd, 10acd

*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.