

## DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Dermatoskopické vyšetření:**
  - a) zpřesňuje diagnózu u velmi malých melanocytárních lézí
  - b) zvyšuje počet excízií melanocytárních lézí
  - c) je přínosné zejména u nodulárních melanomů
  - d) odliší bazaliomy od spinaliomů
2. **Pro přesnou T klasifikaci melanomu jsou nezbytné následující údaje:**
  - a) Breslow, Clark, pigmentace, počet mitóz na mm<sup>2</sup>
  - b) Breslow, Clark jen v případě ulcerace nádoru, pigmentace, počet mitóz na mm<sup>2</sup>
  - c) Breslow, Clark jen u nádorů tenčích než 1mm, pigmentace, počet mitóz na mm<sup>2</sup>
  - d) Breslow, Clark jen u nádorů tenčích než 1mm, ulcerace, počet mitóz na mm<sup>2</sup>
3. **Indikací k vyšetření sentinelové uzliny je**
  - a) tloušťka nádoru menší než 1 mm
  - b) ulcerace nádoru
  - c) radikální excize primárního nádoru
  - d) hmatná zvětšená uzlina
4. **Jako mikrometastázy označujeme:**
  - a) metastázy menší než 0,1 mm
  - b) drobná nádorová ložiska v okolí primárního nádoru
  - c) nádorová ložiska v sentinelové uzlině
  - d) drobné metastázy v plicích nebo játrech
5. **Pegylovaný interferon alfa:**
  - a) je nové označení klasického interferonu alfa
  - b) má vyšší toxicitu než klasické interferony alfa
  - c) vylučuje se rychleji z organismu
  - d) aplikuje se pouze 1krát týdně
6. **Která z následujících možností nejlépe odpovídá účinkům ipilimumabu**
  - a) blokuje receptor CTLA-4 a tím snižuje aktivitu a proliferaci T lymfocytů
  - b) blokuje receptor CTLA-4 a tím zvyšuje aktivitu a proliferaci T lymfocytů
  - c) brání vzniku autoimunitních reakcí
  - d) léčebný účinek se objevuje velmi rychle
7. **Nejčastější nežádoucí účinky ipilimumabu jsou:**
  - a) kožní a gastrointestinální toxicita
  - b) hematologická toxicita
  - c) únava a psychické problémy
  - d) bolesti kloubů
8. **Která z následujících možností nejlépe odpovídá účinkům vemurafenibu**
  - a) je účinný pouze u slizničních a očních melanomů
  - b) způsobuje aktivaci MAPK signální dráhy
  - c) je účinný selektivní inhibitor BRAF mutace
  - d) léčebný účinek se objevuje až v odstupu řady týdnů či měsíců
9. **Mezi nežádoucí účinky vemurafenibu většinou nepatří:**
  - a) vysoké teploty
  - b) bolesti kloubů
  - c) vznik spinocelulárních karcinomů
  - d) kožní toxicita
10. **Intervaly sledování nemocných po operaci melanomu by měly být určovány:**
  - a) výsledky základních hematologických vyšetření
  - b) kožním fototypem a rodinnou anamnézou
  - c) výsledky PET/CT vyšetření
  - d) stadiem onemocnění v době stanovení diagnózy

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity\* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 4/2012:

**Pánková R.: Diferenciální diagnostika pruritu**

**Správné odpovědi: 1c, 2acd, 3abcd, 4d, 5ac, 6bd 7ad, 8abcd, 9abc, 10acd.**

\*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012