

Kontrolní test

- Která diagnóza nepatří mezi chronické kopřivky?**
 - urticaria cholinergica
 - urticaria e frigore
 - urticaria solaris
 - urticaria pigmentosa
- Co hodnotíme při zjišťování UAS (Urticaria Activity Score)?**
 - pomfy a angioedém
 - pomfy a pruritus
 - pomfy a nutnost užívání antihistaminik
 - pruritus a angioedém
- Pacienti s akutní kopřivkou by měli:**
 - především 3–4 týdny držet dietu s omezením pseudoalergenů
 - užívat antibiotika k léčbě možných infekčních fokusů
 - podstoupit základní onkoscreening (RTG plic, PSA atd.)
 - být primárně léčeni nesedativními antihistaminiky, bez dalšího podrobnějšího vyšetřování
- Co nepatří do diferenciální diagnostiky u kopřivky?**
 - Schnitzlerův syndrom
 - urticaria vasculitis
 - ACE – inhibitory indukovaný angioedém
 - Gorlinův syndrom
- Co je standardní léčbou chronické kopřivky?**
 - sedativní antihistaminika podávaná na noc
 - bolus kortikosteroidů v první linii léčby
 - nesedativní antihistaminika druhé generace v první linii léčby
 - dieta s omezením pseudoalergenů
- Který preparát není podle nejnovějších doporučení vhodný k léčbě kopřivky?**
 - H1 – antihistaminika
 - kortikosteroidy
 - dapson
 - montelukast
- Která terapie je doporučována jako druhý krok u chronické kopřivky při selhání léčby první linie?**
 - výměna H1 – antihistaminika
 - přidání sedativního antihistaminika první generace na noc ke stávající terapii
 - přidání montelukastu ke stávající terapii
 - navýšení dávky H1 – antihistaminika druhé generace až na 4násobek základního dávkování
- Co nepatří do histologického obrazu kopřivky?**
 - edém kória
 - dilatace postkapilárních venul
 - parakeratóza
 - perivaskulární zánětlivý infiltrát
- Omalizumab je:**
 - anti TNF α protilátka
 - anti IgE protilátka
 - lék první volby u hereditárního angioedému
 - EGFR inhibitor
- Pro urticaria vasculitis platí, že:**
 - patří mezi fyzikální kopřivky
 - je vyvolána působením zvýšené teploty
 - mohou být postiženy vnitřní orgány
 - pomfy trvají 2–3 hodiny

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlejte na e-mailovou adresu redakce: kozni@lfl.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 1/2014:

Bienová, M.: Dermatoskopická diagnostika alopecí

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4d, 5a, 6d, 7b, 8c, 9b, 10c.