

# DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

## KONTROLNÍ TEST

1. **Shodným znakem porokeratóz je tzv.**
  - a) keratotická lamela
  - b) kornoidní lamela
  - c) dysplastická lamela
  - d) atrofická lamela
2. **Mezi klinické formy porokeratózy nepatří**
  - a) porokeratosis punctata palmaris et plantaris
  - b) porokeratosis serpiginosa
  - c) porokeratosis ptychotropica
  - d) porokeratosis linearis
3. **Porokeratózy se objevují**
  - a) pouze v dospělosti
  - b) v jakémkoliv věku, a to pouze po expozici UV záření
  - c) pouze v dětství
  - d) v jakémkoliv věku, záleží na typu porokeratózy
4. **Ke stanovení diagnózy porokeratózy**
  - a) stačí typický klinický obraz, u PK histopatologické vyšetření nemá charakteristický rys
  - b) je nutná biopsie z centra léze
  - c) může přispět dermatoskopické vyšetření či konfokální
  - d) nelze použít dermatoskop či konfokální mikroskop
5. **Zvažované zevní faktory přispívající k manifestaci PK jsou**
  - a) imunosuprese
  - b) stres
  - c) mechanické podráždění
  - d) ACE-inhibitory
6. **U PK riziko maligního zvratu**
  - a) není a pacienti není třeba sledovat
  - b) je, byl zaznamenán výskyt převážně bazocelulárních karcinomů v ložisku PK
  - c) je, byl zaznamenán výskyt převážně spinocelulárních karcinomů v ložisku PK
  - d) je, byl zaznamenán výskyt převážně melanomů v ložisku PK
7. **Porokeratosis Mibelli**
  - a) je diseminovaná forma PK
  - b) se vyskytuje hlavně u žen ve vyšším věku
  - c) může postihovat i nehtový aparát
  - d) se rychle zhojí po lokálních kortikosteroidech
8. **Porokeratosis superficialis actinica disseminata bývá obvykle lokalizována**
  - a) nad extenzory horních končetin, ramenou a na zádech
  - b) ve kšticí a na genitálu
  - c) na trupu a na hýždích
  - d) generalizovaně kdekoliv na těle
9. **K terapii PK můžeme použít**
  - a) systémové kortikosteroidy
  - b) lokální či systémové retinoidy
  - c) antimalarika
  - d) UVB fototerapii
10. **Invazivní metody (kryoterapie, elektrodestrukce, exkochleace, dermabraze, chirurgická excize, ablační lasery) v terapii PK**
  - a) jsou vhodné pouze u dětí
  - b) jsou vhodné pouze u dospělých
  - c) jsou vhodné a lze je použít převážně u malého počtu lézí
  - d) nepoužíváme

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zaslány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 3/2016  
**Janoušková G., Machovcová A.: Kontaktní dermatitidy**  
 Správné odpovědi: 1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6b, 7b, 8c, 9b, 10bc.