

# KONTROLNÍ TEST

## 1. Mycosis fungoides je:

- a) častá povrchová mykotická infekce
- b) onemocnění ze skupiny primárních B buněčných kožních lymfomů
- c) onemocnění, jehož projevy mohou připomínat klobouky hub
- d) je CD 30+ lymfoproliferativní onemocnění

## 2. Mycosis fungoides je typem:

- a) Hodgkinova lymfomu
- b) folikulárního lymfomu
- c) lymfomu z malých lymfocytů
- d) primárního kožního T lymfomu

## 3. Mycosis fungoides obvykle probíhá:

- a) agresivně, s rychlým rozvojem tumorů
- b) mnohaletým vývojem ve třech na sebe navazujících stádiích
- c) již od dětství
- d) inaparentně, diagnostikováno je až při postižení vnitřních orgánů

## 4. Pro folikulotropní mycosis fungoides je typické, že:

- a) postihuje pouze oblast hlavy a krku
- b) má lepší prognózu než klasická MF
- c) postihuje častěji ženy
- d) v histologickém obraze nacházíme akumulaci mucinu ve vlasových folikulech

## 5. Sézaryho buňky:

- a) jsou atypické lymfocyty s cerebriformním jádrem
- b) jsou malé B lymfocyty
- c) pochází z efektorových paměťových T lymfocytů (TEM)
- d) exprimují fenotyp CCR4+/CLA+/CCR7-/L-selektin –

## 6. Mezi doprovázející příznaky MF/SS nepatří:

- a) alopecie
- b) pruritus
- c) hypothyreóza
- d) narušená termoregulace

## 7. Diagnostika MF/SS:

- a) je snadná, napomáhají k ní zobrazovací vyšetřovací metody
- b) se opírá o kombinaci klinického, histologického, imunohistochemického a genetického vyšetření
- c) je většinou stanovena časně po výskytu prvních příznaků onemocnění
- d) je stanovena průměrně za 8–10 let od počátku onemocnění

## 8. Do léčebných možností používaných v terapii mycosis fungoides nepatří:

- a) fototerapie UVB 311nm
- b) bexaroten
- c) extrakorporální fotoferéza
- d) adalimumab

## 9. Sézaryho syndrom je definován triádou:

- a) erythrodermie, generalizovaná lymfadenopatie, přítomnost cirkulujících maligních T lymfocytů v periferní krvi
- b) erythrodermie, hepatosplenomegalie, pruritus
- c) pruritus, přítomnost Lutznerových buněk v periferní krvi, erytemoskvamózní ložiska po těle
- d) poruchy spánku, úzkost a deprese

## 10. Extrakorporální fotoferéza:

- a) je standartní léčba atopické dermatitidy
- b) patří do léčby cílené na kůži
- c) specificky aktivuje imunitní reakci namířenou proti maligním T lymfocytům
- d) využívá UVB záření

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.

Odpovědi pošlete na e-mailovou adresu: [kozni@lf1.cuni.cz](mailto:kozni@lf1.cuni.cz) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK (ČLK ID)**.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 1/2022: Rob F., Němcová J., Šmahelová J., Marx J., Ondič O.: Anální karcinom a jeho screening

Správné odpovědi: **1b, 2d, 3c, 4a, 5a, 6c, 7c, 8d, 9b, 10a**