

KONTROLNÍ TEST

1. Systémová léčba AD je indikována v případě:

- a) neúčinné intenzivní lokální protizánětlivé léčby
- b) výrazně snížené kvality života
- c) postižení viditelných/citlivých partií
- d) vše z uvedeného

2. K systémové léčbě AD lze použít:

- a) cyklosporin A
- b) metotrexát
- c) azathioprin
- d) vše z uvedeného

3. Iničiálním léčebným cílem (po 3–4 měsících léčby) u systémové/biologické/cílené léčby AD je:

- a) dosažení EASI 75
- b) pokles DLQI o 7 bodů
- c) snížení NRS alespoň o 4 body
- d) nic z uvedeného

4. Minimální aktivita onemocnění je definovaná při:

- a) dosažení IGA 1/2
- b) dosažení EASI 75
- c) BSA 5 %
- d) DLQI 0/1

5. Cyklosporin:

- a) je schváleným systémovým („on-label“) lékem AD od 16 let
- b) počáteční dávka cyklosporinu je 2,5–3 mg/kg/den
- c) maximální kontinuální doba podávání cyklosporinu je 2 roky
- d) vše z uvedeného

6. Metotrexát:

- a) maximální dávka MTX v refrakterních případech je 20 mg/týdně
- b) MTX se užívá s jídlem
- c) během léčby MTX se musí monitorovat renální funkce a krevní tlak

- d) početí (u mužů i žen) je během léčby a následných 6 měsíců po ukončení léčby kontraindikované

7. Azathioprin:

- a) má rychlý nástup účinku, maximální účinnost je dosažena za 4 týdny
- b) počáteční dávka u dospělých je 2 mg/kg/den
- c) před zahájením léčby se musí vyšetřit aktivita enzymu thiopurin metyltransferázy (TPMT)
- d) azathioprin je kontraindikovaný v těhotenství

8. Dupilumab:

- a) je indikovaný k léčbě středně závažné a závažné AD od 6 let věku
- b) nejčastějším nežádoucím účinkem dupilumabu je konjunktivitida
- c) pravidelný laboratorní monitoring dupilumabu není nutný
- d) vše z uvedeného

9. JAK inhibitory:

- a) mají imunosupresivní, protizánětlivé a antiproliferativní účinky
- b) k léčbě středně závažné a těžké AD jsou registrované abrocitinib, baricitinib, upadacitinib
- c) před léčbou a během léčby je nutné pravidelně provádět laboratorní kontroly a vylučovat aktivní infekce
- d) vše z uvedeného

10. Za rizikového pacienta pro léčbu JAK inhibitory je nutné považovat:

- a) pacienta staršího 60 let
- b) pacienta s revmatoidní artritidou
- c) pacienta s anamnézou hluboké žilní trombózy a plicní embolie
- d) nic z uvedeného

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.

Odpovědi pošlete na e-mailovou adresu: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK, SLK (ID)**.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č.2/2023: Machovcová A: **Atopická dermatida: současná doporučení pro diagnostiku a léčbu. Část I.**

Správné odpovědi: 1a, 2a, 3c, 4d, 5a, 6a, 7c, 8d, 9b, 10b.